08　胆道癌

※ レジメン名称を　クリック　または　Ctrl　＋クリック　してください。該当ページに移動します。
※ 印刷時は、“現在のページを印刷する”　を選んでください。

	分 類	コード	レジメン名 称	備 考
1	共通	08001-1A	GEM 単独療法（胆道）	
2	共通	08002-1A	GEM＋CDDP 療法	
3	共通	08002-2A	GEM＋CDDP 療法（パロノセトロン）	
4	共通	08003-1A	ゲムシタビン+S-1 療法（胆道）	
5	共通	08004-1A	デュルバルマブ+GC	
6	共通	08004-2A	デュルバルマブ単独(胆道)	

08001	胆管(道)癌	GEM 単独療法(胆道)	申請科 内科

H23.1 改訂　H27.7 改訂　H28.9 改訂　H29.6 改訂　H30.9 改訂　R2.6 改訂 R3. 5 改訂

薬　品　名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1 ｸｰﾙ)
ゲムシタビン (Gemcitabine)	1000mg／㎡	div(30分)	Day 1、8、15

3投1休
4週毎
効果なくなるまで

化療ベット予約：1 時間で登録

Regimen

	day1、8、15	
15分	ﾒｲﾝ①グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg　1B	
30 分	側①5%ブドウ糖液　100mL　1B ゲムシタビン点滴静注用（　）mg	
全開 (5 分)	側②生理食塩液　50mL　1B	

備　考

【レジメンシステム登録】
08001-1A　GEM 単独療法(胆道)

08002	胆管(道)癌	GEM＋CDDP 療法	申請科 内科

H24.11 改訂　H28.9 改訂　H29.6 改訂　H30.9 改訂　R2.6 改訂 R3. 5 改訂　R4. 3 改訂

薬　品　名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1 ｸｰﾙ)
ゲムシタビン (Gemcitabine)	1000mg／㎡	div(30分)	Day 1、8
シスプラチン (cisplatin)	25mg／㎡	div(90分)	Day 1、8

3週毎
効果なくなるまで

化療ベット予約：4 時間で登録

Regimen

	day1、8
30 分	ﾒｲﾝ①グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg　1B デキサート注　6. 6mg　1V
90 分	ﾒｲﾝ②生理食塩液　500mL　1B
90 分	側①(ﾒｲﾝ②と同時に) 生理食塩液　500mL　1B シスプラチン注　(　　)mg
5 分	側②生理食塩液　50mL　1B
30 分	側③5%ブドウ糖液　100mL　1B ゲムシタビン点滴静注用　(　　)mg
60 分	側④生理食塩液　500mL　1B

備　考

【レジメンシステム登録】
08002-1A　GEM＋CDDP 療法
08002-2A　GEM＋CDDP 療法(パロノセトロン)

08002	胆管(道)癌	GEM＋CDDP 療法(ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ)	申請科 内科

H24.11 改訂　H28.9 改訂　H29.6 改訂　H30.9 改訂　R2.6 改訂 R3. 5 改訂　R4. 3 改訂

薬　品　名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1 ｸｰﾙ)
ゲムシタビン (Gemcitabine)	1000mg／㎡	div(30分)	Day 1、8
シスプラチン (cisplatin)	25mg／㎡	div(90分)	Day 1、8

3週毎
効果なくなるまで

化療ベット予約：4 時間で登録

Regimen

	day1、8
30 分	ﾒｲﾝ①ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg　1V デキサート注　6. 6mg　1V
90 分	ﾒｲﾝ②生理食塩液　500mL　1B
90 分	側①(ﾒｲﾝ②と同時に) 生理食塩液　500mL　1B シスプラチン注　(　　)mg
5 分	側②生理食塩液　50mL　1B
30 分	側③5%ブドウ糖液　100mL　1B ゲムシタビン点滴静注用　(　　)mg
60 分	側④生理食塩液　500mL　1B

備　考

【レジメンシステム登録】
08002-1A　GEM＋CDDP 療法
08002-2A　GEM＋CDDP 療法(パロノセトロン)

2022 年 6 月登録

コード	分類	病名	レジメン名称	申請科
08003-1A	共通	切除不能または再発胆道癌	ゲムシタビン+S-1 療法(胆道)	外科

適応患者

病期(stage)； Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ PS； 0～1 （ まで）	□adjuvant □ neoadjuvant ■再発・進行 □その他（ ）

薬剤の量・経路・時間・1クールの投与方法・インターバル日数、最大投与回数(クール数)、化療ベット時間

薬 品 名	1回(1日)投与量	投与経路及び時間	投与方法(1 クール)
エスワンタイホウ (S-1)	1.25 ㎡未満 :30mg/回 1.25～1.5 ㎡未満:40mg/回 1.5 ㎡以上 :50mg/回 1 日 2 回朝夕食後 (60mg/㎡/day)	p.o.	day1(夕)～day15(朝) 7 日間休薬
ゲムシタビン (Gemcitabine)	1000mg/㎡	div.(30 分)	day1、8
インターバル日数・ 最大投与回数(End point)	3 週毎・効果がなくなるまで	化療ベット予約: 1 時間で登録	

Radiation 併用 有 ・ 無　　1回 Gy× 日、 Total Gy× Fr

レジメン

投与時間	投与日及び投与ルート
内服	day1(夕)～15(朝) (7 日間休薬) エスワンタイホウ( )mg 分 2 朝夕食後
	day1、8
15 分	メイン①グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1 本
30 分	側①5%ブドウ糖液 100mL 1B ゲムシタビン点滴静注用( )mg
全開 (5 分)	側②生理食塩液 50mL 1B

備 考

・S-1 は他のフッ化ピリミジン系薬剤とは併用禁忌。前治療がある場合は、投与終了後7日以上経過していることを確認し、残薬の所持を確認する。残薬所持の場合は、併用しないようにする。

・S-1 は腎機能(CRE、Ccr)が施設正常範囲内であることを確認する。逸脱する場合は、減量もしくは投与不可となる。

【レジメンシステム登録】
08003-1A ゲムシタビン+S-1 療法(胆道)
・S-1 は処方オーダ入力

2023 年 3 月登録

コード	分類	病名	レジメン名称	申請科
08004-1A	共通	治癒切除不能な胆道癌	デュルバルマブ+GC	消化器内科

適応患者

病期(stage)； Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb (Ⅳ) PS； 0～1 （ まで）	□adjuvant □neoadjuvant ■再発・進行 ■その他（未治療）

薬剤の量・経路・時間・1クールの投与方法・インターバル日数、最大投与回数（クール数）、化療ベット時間

薬 品 名	1回（1日）投与量	投与経路及び時間	投与方法(1 ｸｰﾙ)
イミフィンジ (Durvalumab)	1500mg※	div(60 分)	Day1
シスプラチン (Cisplatin)	25mg/㎡	div(90 分)	Day1、8
ゲムシタビン (Gemcitabine)	1000mg/㎡	div(30 分)	Day1、8
インターバル日数・ 最大投与回数(End point)	3 週毎・8 回	化療ベット予約：Day1：5 時間、Day8：4 時間で登録	
Radiation 併用 有 ・無	1回 Gy× 日、Total Gy× Fr		

レジメン

投与時間	day1
5 分	ﾒｲﾝ①生理食塩液 50mL 1B
60 分	側①生理食塩液 100mL 1B イミフィンジ 500mg 3V
5 分	側②生理食塩液 50mL 1B
30 分	ﾒｲﾝ②ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V
90 分	ﾒｲﾝ③生理食塩液 500mL 1B
90 分	側③（ﾒｲﾝ③と同時に） 生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 （ ）mg
5 分	側④生理食塩液 50mL 1B
30 分	側⑤5%ブドウ糖液 100mL 1B ゲムシタビン点滴静注用（ ）mg
60 分	側⑥生理食塩液 500mL 1B

	day8
30 分	ﾒｲﾝ①ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V
90 分	ﾒｲﾝ②生理食塩液 500mL 1B
90 分	側①（ﾒｲﾝ②と同時に） 生理食塩 500mL 1B シスプラチン注 （ ）mg
5 分	側②生理食塩液 50mL 1B
30 分	側③5%ブドウ糖液 100mL 1B ゲムシタビン点滴静注用（ ）mg
60 分	側④生理食塩液 500mL 1B

備 考

※体重 30kg 以下の場合 1 回投与量は 20mg/kg（体重）とする必要があるため薬剤部に要事前申請

・イミフィンジ投与にあたり、インラインフィルター（0.2 又は 0.22μm）を使用すること

・イミフィンジは 60 分以上かけて点滴静注すること

・デカドロンは適宜内服処方オーダ

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 4mg 2 錠 分 2 朝昼食後 day2,3 と 9,10

【レジメンシステム登録】

08004-1A デュルバルマブ+GC

2023 年 3 月登録

コード	分類	病名	レジメン名称	申請科
08004-2A	共通	治癒切除不能な胆道癌	デュルバルマブ単独(胆道)	消化器内科

適応患者

病期(stage)； Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ PS； 0～1 （ まで）	□adjuvant □neoadjuvant ■再発・進行 ■その他(未治療)

薬剤の量・経路・時間・1クールの投与方法・インターバル日数、最大投与回数(クール数)、化療ベット時間

薬 品 名	1回(1日)投与量	投与経路及び時間	投与方法(1 ｸｰﾙ)
イミフィンジ (Durvalumab)	1500mg※	div(60 分)	Day1
インターバル日数・ 最大投与回数(End point)	4 週毎 PD または許容できない毒性が認められるまで	化療ベット予約： 1.5 時間で登録	
Radiation 併用 有 ・無	1回 Gy× 日、Total Gy× Fr		

レジメン

投与時間			
	day1		
5 分	ﾒｲﾝ①生理食塩液	50mL	1B
60 分	側①生理食塩液	100mL	1B
	イミフィンジ	500mg	3V
5 分 (全開)	側②生理食塩液	50mL	1B

備 考

※体重 30kg 以下の場合 1 回投与量は 20mg/kg（体重）とする必要があるため薬剤部に要事前申請

・デュルバルマブ+GC 療法(最大 8 コース)施行後に適応

・イミフィンジ投与にあたり、インラインフィルター(0.2 又は 0.22μm）を使用すること

・イミフィンジは 60 分以上かけて点滴静注すること

【レジメンシステム登録】

08004-2A デュルバルマブ単独(胆道)