

08 胆道癌

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	08001-1A	GEM 単独療法(胆道)	
2	共通	08002-1A	GEM+CDDP 療法	
3	共通	08002-2A	GEM+CDDP 療法(アキシ)	

08001

胆管(道)癌

GEM 単独療法(胆道)

申請科

内科

H23.1 改訂 H27.7 改訂 H28.9 改訂 H29.6 改訂 H30.9 改訂 R2.6 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1ケル)
ゲムシタビン (Gemcitabine)	1000mg/m ²	div(30分)	Day 1、8、15
3投1休 4週毎 効果なくなるまで			
化療ベット予約：1時間で登録			
Regimen			
	day1、8、15		
15分	メイン①生理食塩液 50mL 1B グラニセトロン注 1mg 1A		
30分	側①5%ブドウ糖液 100mL 1B ゲムシタビン点滴静注用 ()mg		
全開 (5分)	側②生理食塩液 50mL 1B		
備 考			
【レジメンシステム登録】 08001-1A GEM 単独療法(胆道)			

08002

胆管(道)癌

GEM+CDDP 療法

申請科

内科

H24.11 改訂 H28.9 改訂 H29.6 改訂 H30.9 改訂 R2.6 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ゲムシタビン (Gemcitabine)	1000mg/m ²	div(30分)	Day 1、8
シスプラチン (cisplatin)	25mg/m ²	div(90分)	Day 1、8
3週毎 効果なくなるまで			
化療ベット予約：4時間で登録			
Regimen			
day1、8			
30分	メイン①生理食塩液 100mL 1B デキサート注 6.6mg 1V グラニセトロン注 1mg 1A 又は アロキシ注0.75mg 1V		
90分	メイン②生理食塩液 500mL 1B		
90分	側①(メイン②と同時に) 生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg		
5分	側②生理食塩液 50mL 1B		
30分	側③5%ブドウ糖液 100mL 1B ゲムシタビン点滴静注用 ()mg		
60分	側④生理食塩液 500mL 1B		
備 考			
【レジメンシステム登録】 08002-1A GEM+CDDP 療法 08002-2A GEM+CDDP 療法(アロキシ)			