

13 副腎癌

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	13001-1A	EDP療法	

13001	副腎癌	EDP 療法	申請科
			泌尿器科

H22.10 登録 H27.7 改訂 H30.10 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ドキシソルビシン塩酸塩 (doxorubisin)	20mg/m ²	div. (30min)	day1、8
シスプラチン(CDDP) (cisplatin)	40mg/m ²	div. (120min)	day1、9
エトポシド (etoposido)	100mg/m ²	div. (90min)	day5~7
4週毎 効果なくなるまで			
Regimen			
day1		day8	
6時間	メイン①ソルアセトF 500mL 1B	2時間	メイン①ソルアセトF 500mL 1B
30分	側①(メイン①と並行して投与) グラニセロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V デキサート注 1.65mg 2A	30分	側①(メイン①と並行して投与) グラニセロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V
30分	側②生理食塩液 100mL 1B ドキシソルビシン塩酸塩注 ()mg	30分	側②生理食塩液 100mL 1B ドキシソルビシン塩酸塩注 ()mg
30分	側③(メイン①を止めて投与) マンニトール S 300mL 1B	5分	側③生理食塩液 50mL 1B
2時間	側④生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg	6時間	day9 メイン①ソルアセトF 500mL 1B
5分	側⑤生理食塩液 50mL 1B	30分	側①(メイン①と並行して投与) グラニセロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V デキサート注 1.65mg 2A
6時間	メイン②ソルデム6 500mL 1B	30分	側②(メイン①を止めて投与) マンニトール S 300mL 1B
6時間	メイン③ソルアセトF 500mL 1B	2時間	側③生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg
6時間	メイン④ソルデム6 500mL 1B	5分	側④生理食塩液 50mL 1B
	day5~7	6時間	メイン②ソルデム6 500mL 1B
2時間	メイン①ソルアセトF 500mL 1B	6時間	メイン③ソルアセトF 500mL 1B
30分	側①(メイン①と並行して投与) グラニセロン点滴静注バッグ 1mg 1B	6時間	メイン④ソルデム6 500mL 1B
90分	側②生理食塩液 500mL 1B エトポシド注 ()mg	備 考	
5分	側③生理食塩液 50mL 1B	【レジメンシステム登録】 13001-1A EDP 療法	