## 13 副腎癌

- ※ レジメン名称を <mark>クリック</mark> または **Ctrl** + クリック してください。該当ページに移動します。
- ※ 印刷時は、"現在のページを印刷する" を選んでください。

	分 類	コード	レジメン名 称	備考
1	共通	13001-1A	EDP 療法	

13001

## 副腎癌

## EDP 療法

申請科

泌尿器科

H22.10 登録 H27.7 改訂 H30.10 改訂 R2.6 改訂

	薬 品 名	1回投与量		投.		投与方法(1	クール)		
				女子経路 時间 div. (30min)		<del>投与方法(19~ル)</del> day1、8			
ドキソルビシン塩酸塩 (doxorubisin)		20mg∕ m <sup>3</sup>		aiv. (c	SOIIIII)	uay I 、o			
(doxori	udisin <i>)</i>								
 	= 11. (0000)				1001)	d 1 O			
シスプラチン(CDDP)		40mg∕m <sup>²</sup>		div. (120min)		day1、9			
(cisplatin)									
-1 485 16		100 4-3							
エトポシド		100mg∕m²		div. (90min)		day5 <b>∼</b> 7			
(etoposido)									
4週毎 効果なくなるまで									
Regim				ı					
	day1				day8				
6時間	メイン①ソリューゲ	ンF 500mL	1B	2時間	メイン①ソリューゲ		1B		
1	/mil (2) / 1 / 1 / 2 / 1 / 1			30 分	側①(メイン①とす				
30 分	側①(メイン①と並行して投与) 生理食塩液100mL		45		生理食塩液		1B		
		· ·	1B				1A		
			1 A 1 V	30 分		_	1V 1B		
	デキサート	_	2A	30 77					
テキザート   30 分   側②生理食塩泡		_	1B	5分	側③生理食塩液		1B		
30 /1		シン塩酸塩注(	)mg	0 /1	別 関切主達長塩液 Joine		16		
30 分			/111B		day9				
	マンニットール S 300mL		1B	6時間	メイン①ソリューゲ	ンF 500mL	1B		
2時間			1B	30 分	側①(メイン①とす				
シスプラチ					生理食塩液100mL 1B		1B		
5分 側⑤生理食塩液		莈 50mL 1B			グラニセトロン注 1mg 1A		1A		
6時間 メイン②ソルデム6		5 500mL 1B			デキサート	·注 6.6mg	1V		
6時間	メイン③ソリューゲ	ンF 500mL	1B		デキサート	·注 1.65mg	2A		
6時間 メイン④ソルデム6		500mL	1B	30 分	側②(メイン①を』	上めて投与)			
						ールS 300mL			
day5~7				2時間	側③生理食塩液		1B		
2時間	メイン①ソリューゲ 	ンF 500mL	1B	   <sub>-</sub> ,			mg		
20.7	/Bil (1 / ) (1 / ) (4 ) [. 4	たなして切り			側④生理食塩液		1B		
30 分	側①(メイン①とウ		1B		│メイン②ソルデム6 │メイン③ソリューゲ		1B		
	生理食塩液		1B 1A		メイン③ソリューク   メイン④ソルデム6		1B 1B		
90 分			1B			JOUITL	וט		
30 )]	側②生理良塩液 500mL IB		10	備考					
5 分			1B	【レジメンシステム登録】					
- / 3	MOTERAL COLLE			13001-	·1A EDP 療法				