

# 15 尿道癌

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	15001-1A	<a href="#">FP+Radiation 療法(尿道癌)(側管)</a>	

15001

尿道癌

FP +Radiation 療法(尿道癌)(側管)

申請科

泌尿器科

H28.1改訂、H28.6改訂 H30.3改訂 R2.6改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
フルオロウラシル (5-FU)	750mg/m <sup>2</sup> /day	div.(24h 持続)	Day1~3、29~31
シスプラチン(CDDP) (cisplatin)	60mg/m <sup>2</sup> /day	div.(120分)	Day1、29 (1週投与、3週休み)
Radiation	2Gy/Day (60Gy/30Fr/6w)		Day1~5、8~12、 15~19、22~26 29~33、36~40
上記1クールで終了			
Regimen			
	<b>day0、day28</b> ※day0・28 はレジメン外で別途オーダーが必要	4時間	メイン②ソリューゲンF 500mL 1B
8時間	メイン①ソリューゲンF 500mL 1B	4時間	メイン③アセトキープ3G 500mL 1B
8時間	メイン②アセトキープ3G 500mL 1B	4時間	メイン④ソリューゲンF 500mL 1B
8時間	メイン③ソリューゲンF 500mL 1B	4時間	メイン⑤アセトキープ3G 500mL 1B
	<b>day1、day29</b>	4時間	メイン⑥ソリューゲンF 500mL 1B
4時間	メイン①アセトキープ3G 500mL 1B	6時間	メイン①アセトキープ3G 500mL 1B
30分	側①(メイン①投与開始後、並行して開始) 生理食塩液100mL 1B グラニセトロン注 1mg 1A デキサート注 6.6mg 1V デキサート注 1.65mg 2A	24時間	側①(day1、29の側管⑥に続けて) 生理食塩液 1L 1B フルオロウラシル注 ( )mg
30分	側②(メイン①を止めて投与) マンニトール S 300mL 1B	6時間	メイン②ソリューゲンF 500mL 1B
2時間	側③生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ( )mg	6時間	メイン③アセトキープ3G 500mL 1B
全開 (5分)	側④生理食塩液100mL 1B フロセミド注20mg 1A	6時間	メイン④ソリューゲンF 500mL 1B
30分	側⑤生理食塩液100mL 1B グラニセトロン注 1mg 1A	6時間	メイン④ソリューゲンF 500mL 1B
24時間	側⑥生理食塩液 1L 1B フルオロウラシル注 ( )mg	5分	側②生理食塩液 50mL 1B
		<b>備考</b>	
		・Radiation Total 60Gy/30Fr 2Gy/Day day1~5、8~12、15~19、22~26、29~33、36~40 <b>【レジメンシステム登録】</b> 15001-1A FP+Radiation 療法(尿道癌)(側管)	