

16 前立腺癌

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	16001-1A	DP療法	
2	共通	16002-1B	カバジタキセル療法	患者限定
3	共通	16003-1A	VP-16+CBDCA療法(前立腺)	患者限定(VP-16)

16001	前立腺癌	DP療法	申請科
			泌尿器科

H27.7 改訂 H30.4 改訂 H31.2 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ドセタキセル (docetaxel)	70mg/m ²	div. (2h)	Day1
プレドニン (prednisolone)	10mg/Day (分2;朝・昼)	p. o.	Day1~21
3週毎 効果なくなるまで			化療ベット予約:3時間で登録
Regimen			
内服	day1~21 プレドニン錠(5mg) 2錠分2 朝・昼食後		
30分	メイン①グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V		
2時間	側①生理食塩液 500mL 1B ドセタキセル ()mg		
全開 (5分)	側②生理食塩液 50mL 1B		
備 考			
【レジメンシステム登録】 16001-1A DP療法(入院用) ・デキサート注は、6.6mgで登録 ・プレドニン錠 【入院】レジメン内処方服用 【外来】院外処方オーダー 16001-2A DP療法(外来用) ・デキサート注は、6.6mgで登録 ・プレドニンは院外処方内服オーダー			

16002

前立腺癌

カバジタキセル療法

申請科

泌尿器科

H26.9 承認 H27.7 改訂 H30.12 改訂 H31.2 改訂 R2.3 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂 R6.10 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ジェブタナ (Cabazitaxel)	25mg/m ²	div. (1時間)	Day1
プレドニン (Prednisolone)	5mg×2回/day (分2;朝・昼)	p. o.	Day1~21(連日投与)
ジーラスタ皮下注 (Pegfilgrastim)	3.6mg	皮下	化学療法終了 24~72時間後
原則3週毎(適宜延長)			
効果なくなるまで		化療ベット予約:2時間30分で登録	
Regimen			
内服	day1~21(連日投与) プレドニン錠(5mg) 2錠分2 朝・昼食後	day2~4のうちに1回投与 ジーラスタ皮下注3.6mg 1本	
備 考			
15分	day1 メイン①グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V ファモチジン注 20mg 1V ポララミン注 5mg 1A	・ジェブタナ点滴静注にはエタノールが含まれているため、投与前に必ず問診等を実施し、アルコール過敏、アルコール不耐症の有無を確認すること。 ・0.2又は0.22μmのインラインフィルターを通して投与すること。	
30分	側①生理食塩液 100mL 1B	【レジメンシステム登録】 16002-1A カバジタキセル療法(入院) 16002-2A カバジタキセル療法(外来用)	
1時間	側②5%ブドウ糖液 250mL 1B ジェブタナ ()mg	・プレドニン錠 【入院】レジメン内処方で服用 【外来】院外処方オーダー	
全開 (5分)	側③生理食塩液 50mL 1B	・ペグフィルグラスチムの投与日は day2 で登録 抗がん剤投与終了後、24時間以降3日後くらい(day2~4)までに皮下注射する。 ・2018年12月委員会にてジーラスタ皮下注を追加登録	

16003	前立腺癌	VP-16+CBDCA 療法 (前立腺)	申請科
			泌尿器科

H30.5 登録 R2.6 改訂 R3.5 改訂 R6.9 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
エトポシド (etoposide)	80mg/m ²	div. (90min)	day1, 2, 3
カルボプラチン (carboplatin)	AUC=5	div. (60min)	day1
<p>3~4週毎</p> <p>CBDCA 投与量=AUC 目標値 × (GFR+25)mg/body</p> <p>GFRはCCrの値で換算する。(GFR=Ccr × 体表面積 / 1.72)</p>			
Regimen			
<p>day1</p> <p>5分 メイン①グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V</p> <p>90分 側①5%ブドウ糖液 500mL 1B エトポシド注 ()mg</p> <p>5分 側②生理食塩液 50mL 1B</p> <p>60分 側③5%ブドウ糖液250mL 1B カルボプラチン ()mg</p> <p>5分 側④生理食塩液 50mL 1B</p>		<p>day2, 3</p> <p>10分 メイン①生理食塩液 100mL 1B デキサート注 6.6mg 1V</p> <p>90分 側①5%ブドウ糖液 500mL 1B エトポシド注 ()mg</p> <p>5分 側②生理食塩液 50mL 1B</p>	
<p>備 考</p> <p>【レジメンシステム登録】</p> <p>16003-1A VP-16+CBDCA 療法(前立腺)</p> <p>・1クール3週間で登録</p>			