

17 精巣腫瘍

※ レジメン名称を クリック または Ctrl +クリック してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、“現在のページを印刷する”を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	17001-1A	BEP療法(1,2クール目)	
2	共通	17001-2A	BEP療法(3クール目以降)	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

※ レジメン名称を クリック または Ctrl +クリック してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、“現在のページを印刷する”を選んでください。

17001

精巣腫瘍

BEP 療法(1、2クール目)

申請科

泌尿器科

H.27.8 改訂 H30.7 改訂 R2.3 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂 R3.12 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ブレオ (bleomycin)	30mg/body	div.	day3、10、17
エトポシド (etoposide)	100mg/m ²	div.	day2~6
シスプラチン (cisplatin)	20mg/m ²	div.	day2~6
3週毎 4~6回			
Regimen			
内服	アプレピタントカプセルを併用する。 day2 アプレピタントカプセル125mg 化学療法前 1回 day3~6 アプレピタントカプセル80mg 分1 朝食後		
6時間	メイン①ソルデム3A 500mL 1B	30分	メイン③生理食塩液 100mL 1B
6時間	メイン②ソルデム6 500mL 1B	60分	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa125mg 1V
6時間	メイン③ソルデム3A 500mL 1B	90分	側①生理食塩液 100mL 1B ブレオ30mg 1V
6時間	day1 メイン①ソルデム6 500mL 1B	6時間	側②5%ブドウ糖液 500mL 1B エトポシド注 ()mg
30分	day2、4~6 ※前日払い出し メイン②グラニセトロン点滴静注バッグ1mg 1B	2時間	側③マンニトールS注射液300mL 1B
30分	メイン③生理食塩液 100mL 1B	6時間	側④生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg
90分	メイン④ソルデム3A 500mL 1B	5分	側⑤生理食塩液 50mL 1B
30分	メイン⑤ソルデム6 500mL 1B	6時間	メイン④ソルデム3A 500mL 1B
2時間	day7 メイン③生理食塩液 100mL 1B	6時間	メイン⑤ソルデム6 500mL 1B
5分	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa125mg 1V	6時間	day10、17 メイン①ソルデム3A 500mL 1B
7時間	メイン④ソルデム3A 500mL 1B	30分	メイン①グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B
6時間	メイン⑤ソルデム6 500mL 1B	60分	側①生理食塩液 100mL 1B ブレオ30mg 1V
6時間	day3 メイン①ソルデム3A 500mL 1B	5分	側②生理食塩液 50mL 1B
30分	day3 ※前日払い出し メイン②グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B		
			備考
			【レジメンシステム登録】 17001-1A BEP 療法(1,2クール目) ・アプレピタントはレジメン内の処方に登録

17001

精巣腫瘍

BEP 療法(3クール目以降)

申請科

泌尿器科

H27.8 改訂 H30.7 改訂 R2.3 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂 R3.12 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
エトポシド (etoposide)	100mg/m ²	div.	day2~6
シスプラチン (cisplatin)	20mg/m ²	div.	day2~6
3週毎 4~6回			
Regimen			
内服	アプレピタントカプセルを併用する。 day2 アプレピタントカプセル125mg 化学療法前 1回 day3~6 アプレピタントカプセル80mg 分1 朝食後		day7 6時間 メイン①ソルデム3A 500mL 1B
6時間	メイン①ソルデム3A 500mL	1B	
6時間	メイン②ソルデム6 500mL	1B	
6時間	メイン③ソルデム3A 500mL	1B	
day1			
6時間	メイン①ソルデム6 500mL	1B	
※前日払い出し			
30分	メイン②グラニセトロン点滴静注バッグ1mg	1B	
30分	メイン③生理食塩液 100mL	1B	
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa 125mg	1V	
90分	側①5%ブドウ糖液 500mL	1B	
	エトポシド注 ()mg		
30分	側②マンニトールS注射液300mL	1B	
2時間	側③生理食塩液 500mL	1B	
	シスプラチン注 ()mg		
5分	側④生理食塩液 50mL	1B	
7時間	メイン④ソルデム3A 500mL	1B	
6時間	メイン⑤ソルデム6 500mL	1B	
備考			
【レジメンシステム登録】			
17001-2A BEP 療法(3クール目以降)			
・アプレピタントはレジメン内の処方に登録			