18　陰茎癌

※ レジメン名称を　クリック または Ctrl ＋クリック してください。該当ページに移動します。
※ 印刷時は、“現在のページを印刷する” を選んでください。

	分 類	コード	レジメン名 称	備 考
1	共通	18001-1A	MPB療法	
2	共通	18002-1A	MP療法	

18001	陰茎癌	ＭＰＢ療法	申請科 泌尿器科

H22.6 登録　H.28.1 改訂　H30.7 改訂　R2.6 改訂　R3.5 改訂 R5.12 改訂

薬　品　名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法（1 ｸｰﾙ）
メソトレキセート （methotrexate）	100mg／㎡	div.（1h）	Day1、15
ブレオ （bleomycin）	10mg／㎡	div.（24h持続）	Day2～5
シスプラチン （cisplatin）	20mg／㎡	div.（1h）	Day2～5
ダイアモックス錠 250mg （Acetazolamide）	2錠分2	MTX投与の 30分前、5時間後	Day1
ロイコボリン錠　5mg （leucovorin）	1 日 20mg／6時間毎	メソトレキセート投与 24時間後より p. o.	Day2～4、16～18
4週毎　　ブレオマイシンの総投与量300mgを超えない			

Regimen

内服

day1、15
ダイアモックス錠 250mg　2錠分2
（MTX投与の30分前、5時間後）

day2～4、16～18
メソトレキセート投与24時間後より
ロイコボリン錠　5mg　20錠
分4　6時間

day1、15
6時間　ﾒｲﾝ①ソルアセトF　500mL　1B
メイロン7%　20mL　1A
15分　側①(ﾒｲﾝ①と並行して開始)
生理食塩液　50mL　1B
デキサート　6．6mg　1V
1時間　側②(側①終了後、続けて投与)
生理食塩液　100mL　1B
メソトレキセート（　　）mg
5分　側③(側②終了後、続けて投与)
生理食塩液　50mL　1B
6時間　ﾒｲﾝ②ヴィーン3G　500mL　1B
メイロン7%　20mL　1A
6時間　ﾒｲﾝ③ソルアセトＦ　500mL　1B
6時間　ﾒｲﾝ④ヴィーン3G　500mL　1B

day2～4
6時間　ﾒｲﾝ①ソルアセトF　500mL　1B
24 時間　側①(ﾒｲﾝ①と並行して開始)
生理食塩液　50mL　1B
ブレオ　（　　）mg
ｼﾘﾝｼﾞ 50mL に調製（ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ使用）
30分　側②（ﾌﾞﾚｵ投与開始後、並行して開始
側①ﾌﾞﾚｵと別ルートで）
グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg 1B
デキサート6．6mg　1V
30分　側③（側②ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ、ﾃﾞｷｻｰﾄ終了後、同ｰﾙｰﾄから）
マンニットール　300mL　1B
メイン①、側①を止めて投与
1時間　側④（側③ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ終了後、同 ｰﾙｰﾄから）
生理食塩液　100mL　1B
シスプラチン（　　）mg
5分　側⑤（側④ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ終了後、同 ｰﾙｰﾄから）
生理食塩液　50mL　1B
6時間　ﾒｲﾝ②ヴィーン3G　500mL　1B
6時間　ﾒｲﾝ③ソルアセトF　500mL　1B
6時間　ﾒｲﾝ④ヴィーン3G　500mL　1B

Regimen			
	day5		
6時間	メイン①ソルアセトF　500mL　　1B		
24 時間	側①(メイン①と並行して開始) 生理食塩液　50mL　　1B ブレオ　（　　）mg シリンジ 50mL に調製（シリンジポンプ使用）		
30分	側②（ブレオ投与開始後、並行して開始 側①ブレオと別ルートで） グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg　1B デキサート6．6mg　　1V		
30分	側③ （側②グラニセトロン、デキサート終了後、同ールートから） マンニットール　300mL　　1B メイン①、ブレオを止めて投与		
1時間	側④（側③マンニットール終了後、同 ールートから） 生理食塩液　100mL　　1B シスプラチン（　　）mg		
5分	側⑤（側④シスプラチン終了後、同 ールートから） 生理食塩液　50mL　　1B		
6時間	メイン②ヴィーン3G　500mL　1B		
6時間	メイン③ソルアセトF　500mL　　1B		
6時間 5分	メイン④ヴィーン3G　500mL　1B 側⑥(側①ブレオ終了後、同 ールートから） 生理食塩液 50mL　　1B		

備　考

メソトレキセート投与72時間後にメソトレキセート血中濃度測定し、1×10^{-7}mol濃度以下であること確認。これ以上の場合はロイコボリン内服を1×10^{-7}mol濃度以下になるまで継続

【レジメンシステム登録】

18001-1A　MPB 療法

・ロイコボリン、ダイアモックスはレジメン内の処方に登録

18002	陰茎癌	MP療法	申請科 泌尿器科

H22.6 登録　H.28.1 改訂　H30.7 改訂　R2.6 改訂　R3.5 改訂　R5.12 改訂

薬　品　名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法（1 ｸｰﾙ）
メソトレキセート （methotrexate）	100mg／㎡	div.（1h）	Day1、15
シスプラチン （cisplatin）	20mg／㎡	div.（1h）	Day2～5
ダイアモックス錠 250mg （Acetazolamide）	2錠分2	MTX投与の 30分前、5時間後	Day1
ロイコボリン錠　5mg （leucovorin）	1 日 20mg／6時間毎	メソトレキセート投与 24時間後よりp. o.	Day2～4、16～18
4週毎	MPB有効時の維持療法		

Regimen

内服	day1、15 ダイアモックス錠　250mg　2錠分2 （MTX投与の30分前、5時間後） day2～4、16～18 メソトレキセート投与24時間後より ロイコボリン錠　5mg　20錠 分4　6時間
	day1、15
6時間	ﾒｲﾝ①ソルアセトF　500mL　1B
	メイロン7%　20mL　1A
15分	側①(ﾒｲﾝ①と並行して開始)
	生理食塩液　50mL　1B
	デキサート　6. 6mg　1V
1時間	側②(側①終了後、続けて投与)
	生理食塩液　100mL　1B
	メソトレキセート（　　）mg
5分	側③(側②終了後、続けて投与)
	生理食塩液　50mL　1B
6時間	ﾒｲﾝ②ヴィーン3G　500mL　1B
	メイロン7%　20mL　1A
6時間	ﾒｲﾝ③ソルアセトＦ　500mL　1B
6時間	ﾒｲﾝ④ヴィーン3G　500mL　1B

	day　2～5
6時間	ﾒｲﾝ①ソルアセトF　500mL　1B
30分	側①(ﾒｲﾝ①と並行して開始)
	グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg 1B
	デキサート6. 6mg　1V
	側②(側①終了後、続けて投与)
30分	マンニットール　300mL　1B
	ﾒｲﾝ①を止めて投与
	側③(側②終了後、続けて投与)
1時間	生理食塩液　100mL　1B
	シスプラチン（　　）mg
	側④(側③終了後、続けて投与)
5分	生理食塩液　50mL　1B
	ﾒｲﾝ②ヴィーン3G　500mL　1B
6時間	ﾒｲﾝ③ソルアセトF　500mL　1B
6時間	ﾒｲﾝ④ヴィーン3G　500mL　1B
6時間	

備　考

メソトレキセート投与72時間後にメソトレキセート血中濃度測定し、1×10^{-7}mol濃度以下であること確認。これ以上の場合はロイコボリン内服を1×10^{-7}mol濃度以下になるまで継続

【レジメンシステム登録】

18002-1A　MP 療法

・ロイコボリン、ダイアモックスはレジメン内の処方に登録