

19 平滑筋腫瘍

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	19001-1A	IFM+DXR療法	

19001

平滑筋腫瘍

IFM+DXR 療法

申請科

泌尿器科

H22.12 泌尿器科より点滴スケジュール申請 H28.1 改訂 H30.10 改訂 R2.6 改訂

薬品名		1回投与量		投与経路・時間		投与方法(1クール)	
イホマイド (ifosfamide)		1g/m ²		div. (2h)		day1~5	
ドキシソルビシン塩酸塩注 (adriamycin)		50mg/m ²		div. (30分)		day3	
ウロミテキサン (mesna)		0.2g/m ² X 3/day		div. (30分)		day1~5	
3~4週毎 3~6クール ADR500mg/m ² (総量)まで							
Regimen							
day1、2、4、5				day3			
4時間	メイン①アセトキープ3G 500mL	1B	4時間	メイン①アセトキープ3G 500mL	1B	4時間	メイン①アセトキープ3G 500mL
	メイロン7% 20mL	1A		メイロン7% 20mL	1A		メイロン7% 20mL
4時間	メイン②ソリューゲンF 500mL	1B	4時間	メイン②ソリューゲンF 500mL	1B	4時間	メイン②ソリューゲンF 500mL
30分	側①生理食塩液 100mL	1B	30分	側①生理食塩液 100mL	1B	30分	側①生理食塩液 100mL
	グラニセトロン 1mg	1A		グラニセトロン 1mg	1A		グラニセトロン 1mg
	デキサート 6.6mg	1V		デキサート 6.6mg	1V		デキサート 6.6mg
	メイン②と並行して開始			メイン②と並行して開始			
30分	側②マンニトールS 300mL	1B	30分	側②マンニトールS 300mL	1B	30分	側②マンニトールS 300mL
	メイン②を止めて投与			メイン②を止めて投与			
2時間	側③生理食塩液 500mL	1B	2時間	側③生理食塩液 500mL	1B	2時間	側③生理食塩液 500mL
	イホマイド注 ()mg			イホマイド注 ()mg			イホマイド注 ()mg
30分	側④生理食塩液 100mL	1B	30分	側④生理食塩液 100mL	1B	30分	側④生理食塩液 100mL
	ウロミテキサン注 100mg ()mg			ウロミテキサン注 100mg ()mg			ウロミテキサン注 100mg ()mg
4時間	メイン③アセトキープ3G 500mL	1B	30分	側⑤生理食塩液100mL	1B	4時間	メイン③アセトキープ3G 500mL
	メイロン7% 20mL	1A		ドキシソルビシン塩酸塩注 ()mg			メイロン7% 20mL
30分	側⑤生理食塩液 100mL	1B	4時間	メイン③アセトキープ3G 500mL	1B	4時間	メイン③アセトキープ3G 500mL
	ウロミテキサン注 100mg ()mg			メイロン7% 20mL	1A		メイロン7% 20mL
	イホマイド投与4時間後			側⑥生理食塩液 100mL	1B		イホマイド投与4時間後
4時間	メイン④ソリューゲンF 500mL	1B	30分	ウロミテキサン注 100mg ()mg		4時間	メイン④ソリューゲンF 500mL
30分	側⑥生理食塩液 100mL	1B		イホマイド投与4時間後		30分	側⑦生理食塩液 100mL
	ウロミテキサン注 100mg ()mg						ウロミテキサン注 100mg ()mg
	イホマイド投与8時間後			側⑦生理食塩液 100mL	1B		イホマイド投与8時間後
4時間	メイン⑤アセトキープ3G 500mL	1B	4時間	メイン④ソリューゲンF 500mL	1B	4時間	メイン⑤アセトキープ3G 500mL
	メイロン7% 20mL	1A		側⑦生理食塩液 100mL	1B		メイロン7% 20mL
4時間	メイン⑥ソリューゲンF 500mL	1B	4時間	メイン⑤アセトキープ3G 500mL	1B	4時間	メイン⑥ソリューゲンF 500mL
				メイロン7% 20mL	1A		メイロン7% 20mL
				ウロミテキサン注 100mg ()mg			ウロミテキサン注 100mg ()mg
				イホマイド投与8時間後			
備 考				4時間	メイン⑥ソリューゲンF 500mL	1B	
【レジメンシステム登録】							
19001-1A IFM+DXR 療法							
・1クール3週間で入力							