

27 肉腫

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

| | 分類 | コード | レジメン名称 | 備考 |
|---|----|----------|---|----|
| 1 | 共通 | 27001-1A | Paclitaxel 療法 weekly(肉腫)(入院用) | |
| 2 | 共通 | 27001-2A | Paclitaxel 療法 weekly(肉腫)(外来用) | |

| | | | |
|-------|------|--------------------------|-----|
| 27001 | 血管肉腫 | Paclitaxel 療法 weekly(肉腫) | 申請科 |
| | | | 皮膚科 |

H26. 1 登録 H27.7 改訂 H30.10 改訂 R3.9 改訂

| 薬品名 | 1回投与量 | 投与経路・時間 | 投与方法(1クール) |
|---|--|---|------------|
| パクリタキセル (paclitaxel) | 80mg/m ² | div. (1h). | day1、8、15 |
| 3投1休(4週間毎) 耐性になるまで <div style="text-align: right; color: red;">(外来)化療ベット予約:2時間で登録</div> | | | |
| Regimen | | | |
| 内服 | パクリタキセル投与 30 分前に レスタミン錠(10) 5錠 内服 day1、8、15 | | |
| 10分 | メイン①生理食塩液 100mL 1B デキサート注 6.6mg 1V ファモチジン注 20mg 1V | | |
| 30分 | 側①生理食塩液 50mL 1B | 備 考 ・側①生食はドリップアイを使用し滴下時間(30分)を調節するため側管から投与。 【レジメンシステム登録】 27001-1A Paclitaxel 療法 weekly(肉腫)(入院用) ・レスタミンはレジメン内の処方に登録 27001-2A Paclitaxel 療法 weekly(肉腫)(外来用) ・レスタミンは済み処方にて投与 | |
| 1時間 | 側②5%ブドウ糖液 250mL 1B パクリタキセル点滴静注液 ()mg | | |
| 5分 | 側③生理食塩液 50mL 1B | | |