

27 肉腫

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	27001-2A	Paclitaxel 療法 weekly(肉腫)	

27001	血管肉腫	Paclitaxel 療法 weekly(肉腫)	申請科
			皮膚科

H26. 1 登録 H27.7 改訂 H30.10 改訂 R3.9 改訂 R4.3 改訂 R6.10 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
パクリタキセル (paclitaxel)	80mg/m ²	div. (1h).	day1、8、15
3投1休(4週間毎) 耐性になるまで <div style="text-align: right; color: red;">(外来)化療ベット予約:2時間で登録</div>			
Regimen			
	day1、8、15	備 考	
10分	メイン①生理食塩液 100mL 1B デキサート注 6.6mg 1V ファモチジン注 20mg 1V ポララミン注 5mg 1A	・側①生食はドリップアイを使用し滴下時間(30分)を調節するため側管から投与。 【レジメンシステム登録】 27001-2A Paclitaxel 療法 weekly(肉腫)	
30分	側①生理食塩液 50mL 1B		
1時間	側②5%ブドウ糖液 250mL 1B パクリタキセル点滴静注液 ()mg		
5分	側③生理食塩液 50mL 1B		