

30 MSI-High

※ レジメン名称を クリック または Ctrl +クリック してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、“現在のページを印刷する”を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	30001-1A	ペムブロリズマブ療法(MSI-High)	

コード	分類	病名	レジメン名称	申請科
30001-1A	共通	MSI-High	ペムブロリズマブ療法(MSI-High)	外科
適応患者				
病期(stage); I IIa IIb IIIa IIIb IV		<input type="checkbox"/> adjuvant <input type="checkbox"/> neoadjuvant <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
PS; ~ (まで)		<input type="checkbox"/> その他()		
薬剤の量・経路・時間・1クール of 投与方法・インターバル日数、最大投与回数(クール数)、化療ベット時間				
薬品名	1回(1日)投与量	投与経路及び時間	投与方法(1クール)	
キイトルーダ (Pembrolizumab)	200mg/body	div. (30分)	day1	
インターバル日数・ 最大投与回数(End point)	3週毎	化療ベット予約:1時間で登録		
Radiation 併用 無	1回 Gy×	日、Total	Gy×	Fr
レジメン				
投与時間	投与日及び投与ルート			
5分	day1 メイン①生理食塩液 50mL 1B			
30分	側①生理食塩液 100mL 1B キイトルーダ 100mg 2V			
全開 (5分)	側②生理食塩液 50mL 1B			
備考				
<ul style="list-style-type: none"> ・キイトルーダ投与にあたり、インラインフィルター(0.2~5μm)を使用すること。 ・キイトルーダ希釈後の点滴溶液中の最終濃度は1~10mg/mLとなるように調製すること。 ・30分間かけて点滴静注すること。 ・Infusion reaction があらわれることがある。Infusion reaction が認められた場合には、適切な処置を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。 				
【レジメンシステム登録】				
30001-1A ペムブロリズマブ療法(MSI-High)				