

31 原発不明癌

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	31001-1A	ニボルマブ療法(240mg)(原発不明)	

コード	分類	病名	レジメン名称	申請科
31001-1A	共通	原発不明癌	ニボルマブ療法(240mg)(原発不明)	消化器内科
適応患者				
病期(stage); I IIa IIb IIIa IIIb IV PS; 1 ~ 2 (まで)			<input type="checkbox"/> adjuvant <input type="checkbox"/> neoadjuvant <input type="checkbox"/> 再発・進行 <input checked="" type="checkbox"/> その他()	
薬剤の量・経路・時間・1クールでの投与方法・インターバル日数、最大投与回数(クール数)、化療ベット時間				
薬品名	1回(1日)投与量	投与経路及び時間	投与方法(1クール)	
オプジーボ (Nivolumab)	240mg/body	Div(30分)	Day1	
インターバル日数・ 最大投与回数(End point)	2週毎	化療ベット予約:1時間で登録		
Radiation 併用 無	1回 Gy×	日、Total Gy×	Fr	
レジメン				
投与時間	投与日及び投与ルート			
5分	day1 ① 生理食塩液 50mL 1B			
30分	② 生理食塩液 100mL 1B オプジーボ 240mg 1V			
全開 (5分)	③ 生理食塩液 50mL 1B			
備 考				
<p>・オプジーボ投与にあたり、インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用すること。</p> <p>・オプジーボ希釈後の点滴溶液中の最終濃度は0.35mg/mL以上、総液量は60mL以上を目安とすること。</p> <p>なお、希釈する場合、総液量は体重30kg以上の患者には150mL以下、体重30kg未満の患者には100mL以下とする必要があるため、体重30kg未満の場合はボトルから生食30mLを抜き取る(薬剤部調製時)(薬品コメントとして登録済)。</p> <p>・30分以上かけて点滴静注すること。</p> <p>・オプジーボによりinfusion reactionが発現することがあるため、オプジーボとして初回投与時は投与中及び投与終了後バイタルサイン(体温、血圧、脈拍、呼吸数、酸素飽和度)をモニターする等、患者の状態を十分に観察すること。</p> <p>【レジメンシステム登録】 3100-1A ニボルマブ療法(240mg)(原発不明)</p>				