

# 74 膵・消化管神経内分泌腫瘍

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

|   | 分類     | コード      | レジメン名称  | 備考 |
|---|--------|----------|---|----|
| 1 | 共通     | 74001-1A | <a href="#">ストレプトゾシン療法(5日間連日投与)</a>                       |    |
| 2 | 共通     | 74002-1A | <a href="#">(1000mg/m<sup>2</sup>)ストレプトゾシン(1週間間隔投与)療法</a> |    |
| 3 | 共通     | 74002-2A | <a href="#">(1250mg/m<sup>2</sup>)ストレプトゾシン(1週間間隔投与)療法</a> |    |
| 4 | 共通     | 74002-3A | <a href="#">(1500mg/m<sup>2</sup>)ストレプトゾシン(1週間間隔投与)療法</a> |    |
| 5 | 科別(消内) | 74003-1B | <a href="#">VP-16+CDDP 療法(膵・消化管神経内分泌)(アキシ)</a>            |    |
| 6 | 科別(消内) | 74004-1B | <a href="#">CPT-11+CDDP 療法(膵・消化管神経内分泌)(アキシ)</a>           |    |

|       |                  |                         |     |
|-------|------------------|-------------------------|-----|
| 74001 | 膵・消化管<br>神経内分泌腫瘍 | ストレプトゾシン療法<br>(5日間連日投与) | 申請科 |
|       |                  |                         | 消化器 |

H28.5 登録 H30.10 改訂 R2.3 改訂 R2.6 改訂

| 薬品名  | 1回投与量   | 投与経路・時間              | 投与方法(1クール)   |
|--|---|----------------------|--|
| ザノサー<br>(streptozocin)   | 500mg/m <sup>2</sup>  | div (30分)            | day1~5<br>6週毎  |
| 6週毎(5日間連日投与、37日間休薬)<br>可能な限り継続<br>NET G1/G2(2010年WHO分類)に分類される切除不能又は遠隔転移を有する膵・消化器NETに適応 |   |                      |  |
| Regimen  |   |                      |  |
| 内服   | アプレピタントカプセルを併用する。<br>day1は125mg<br>day2、3は80mgを内服               |                      |  |
| 2時間  | メイン①生理食塩液 500mL   | 1B                   |  |
| 30分  | メイン②生理食塩液 100mL<br>グラニセトロン注1mg<br>デキサート注 6.6mg<br>デキサート注 1.65mg | 1B<br>1A<br>1A<br>2A |  |
| 30分  | 側①生理食塩液 100mL<br>ザノサー ( )mg                                     | 1B                   |  |
| 1時間  | 側②生理食塩液 250mL   | 1B                   |  |
| 2時間  | day2~5<br>メイン①生理食塩液 500mL                                       | 1B                   | 備 考<br>【レジメンシステム登録】<br>74001-1A ストレプトゾシン療法(5日間連日投与)<br>・アプレピタントは処方オーダー |
| 30分  | メイン②生理食塩液 100mL<br>グラニセトロン注1mg<br>デキサート注 6.6mg                  | 1B<br>1A<br>1A       |  |
| 30分  | 側①生理食塩液 100mL<br>ザノサー ( )mg                                     | 1B                   |  |
| 1時間  | 側②生理食塩液 250mL   | 1B                   |  |

|       |                  |                                       |     |
|-------|------------------|---------------------------------------|-----|
| 74002 | 膵・消化管<br>神経内分泌腫瘍 | <b>ストレプトゾシン</b><br><b>(1週間間隔投与)療法</b> | 申請科 |
|       |                  |                                       | 消化器 |

H28.8 登録 H30.10 改訂 R2.3 改訂 R2.6 改訂

| 薬品名                    | 1回投与量                      | 投与経路・時間   | 投与方法(1クール) |
|------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| ザノサー<br>(streptozocin) | 1000~1500mg/m <sup>2</sup> | div (30分) | day1       |

1週毎 可能な限り継続

1回量は 1500mg/m<sup>2</sup>を超えないこと

NET G1/G2(2010年WHO分類)に分類される切除不能又は遠隔転移を有する膵・消化器 NET に適応

化療ベッド予約:4時間で登録

Regimen

|     |  |        |    |  |  |
|-----|--|--------|----|--|--|
| 内服  | アプレピタントカプセル、デカドロン錠を併用する。<br>アプレピタントカプセル<br>day1は125mg<br>day2、3は80mgを内服<br>デカドロン錠<br>day2~4は8mg/日を内服 |        |    |  |  |
|     |  |        |    | <b>備 考</b>   |  |
| 2時間 | メイン①生理食塩液  | 500mL  | 1B | ・1回 1000mg/m <sup>2</sup> で投与を開始し、12週目までの<br>忍容性が良好な場合には、1回 1250mg/m <sup>2</sup> に増<br>量することができる。さらに18週目までの忍容性<br>が認められる場合には、最大1回 1500mg/m <sup>2</sup> ま<br>で増量することができる。<br><br><b>【レジメンシステム登録】</b><br>74002-1A (1000mg/m <sup>2</sup> )ストレプトゾシン<br>(1週間間隔投与)療法<br>・ザノサー投与量 1000mg/m <sup>2</sup> で登録<br>・アプレピタント、デカドロンは処方オーダー<br><br>74002-2A (1250mg/m <sup>2</sup> )ストレプトゾシン<br>(1週間間隔投与)療法<br>・ザノサー投与量 1250mg/m <sup>2</sup> で登録<br>・アプレピタント、デカドロンは処方オーダー<br><br>74002-3A (1500mg/m <sup>2</sup> )ストレプトゾシン<br>(1週間間隔投与)療法<br>・ザノサー投与量 1500mg/m <sup>2</sup> で登録<br>・アプレピタント、デカドロンは処方オーダー |  |
| 30分 | メイン②生理食塩液  | 100mL  | 1B |  |  |
|     | グラニセトロン注   | 1mg    | 1A |  |  |
|     | デキサート注   | 6.6mg  | 1A |  |  |
|     | デキサート注   | 1.65mg | 2A |  |  |
| 30分 | 側①生理食塩液  | 100mL  | 1B |  |  |
|     | ザノサー   | ( )mg  |    |  |  |
| 1時間 | 側②生理食塩液  | 250mL  | 1B |  |  |

| コード   | 分類  | 病名   | レジメン名称  | 申請科   |
|---|---|--|---|-------|
| 74003-1B  | 科別  | 膵・消化管<br>神経内分泌腫瘍   | <b>VP-16+CDDP 療法</b><br><b>(膵・消化管神経内分泌)(アロキシ)</b> | 消化器内科 |
| 適応患者  |   |  |   |       |
| 病期(stage); I IIa IIb IIIa IIIb IV<br>PS; ~ (まで)     |   | <input type="checkbox"/> adjuvant <input type="checkbox"/> neoadjuvant <input type="checkbox"/> 再発・進行<br><input type="checkbox"/> その他( ) |   |       |
| 薬剤の量・経路・時間・1クールでの投与方法・インターバル日数、最大投与回数(クール数)、化療ベット時間 |   |  |   |       |
| 薬品名   | 1回(1日)投与量                                       | 投与経路及び時間   | 投与方法(1クール)  |       |
| エトポシド<br>(Etoposide)                                | 100mg/m <sup>2</sup>                            | div. (90分)   | day1, 2, 3  |       |
| シスプラチン<br>(Cisplatin)                               | 80mg/m <sup>2</sup>                             | div. (2h)  | day1  |       |
| インターバル日数・<br>最大投与回数(End point)                      | 3週毎   | 化療ベット予約: 時間で登録   |   |       |
| Radiation 併用 無                                      | 1回 Gy×  | 日、Total Gy×  | Fr  |       |
| レジメン  |   |  |   |       |
| 投与時間  | 投与日及び投与ルート                                      |  |   |       |
| 内服  | アプレピタントカプセルを併用する。<br>day1は125mg<br>day2, 3は80mg |  |   |       |
| 90分   | メイン①ソルデム3A                                      | 500mL 1B   | day2, 3   |       |
| 30分   | メイン②生理食塩液                                       | 100mL 1B   | メイン①ソルデム3A 500mL 1B<br>メトクロプラミド注10mg 1A           |       |
|   | デキサート注  | 6.6mg 1V   | 90分 側①生理食塩液 500mL 1B<br>エトポシド注 ( )mg              |       |
|   | デキサート注  | 1.65mg 2A  | 30分 側②生理食塩液 100mL 1B<br>デキサート注 6.6mg 1V           |       |
| 90分   | 側①生理食塩液   | 500mL 1B   | メイン②ヘパリン Na ロック用(100単位/mL)<br>10mL 1本             |       |
| 30分   | 側②生理食塩液   | 100mL 1B   | アロキシ注 0.75mg 1V                                   |       |
| 90分   | メイン③生理食塩液                                       | 500mL 1B   | 【レジメンシステム登録】                                      |       |
| 30分   | メイン④マンニトールS                                     | 300mL 1B   | 74003-1B VP-16+CDDP 療法                            |       |
| 2時間   | 側③生理食塩液   | 500mL 1B   | 膵・消化管神経内分泌)(アロキシ)                                 |       |
|   | シスプラチン注   | ( )mg  | ・1クール3週間で登録                                       |       |
| 90分   | 側④ソルデム3A  | 500mL 1B   | ・アプレピタントは内服処方オーダー                                 |       |
|   | メトクロプラミド注                                       | 10mg 1A  |   |       |
|   | メイン⑤ヘパリン Na ロック用(100単位/mL)                      | 10mL 1本  |   |       |
| 備考  |   |  |   |       |

| コード  | 分類  | 病名   | レジメン名称   | 申請科                                   |
|--|---|--|--|---------------------------------------|
| 74004-1B   | 科別  | 膵・消化管<br>神経内分泌腫瘍   | <b>CPT-11+CDDP 療法</b><br><b>(膵・消化管神経内分泌)(アロキシ)</b> | 消化器内科                                 |
| 適応患者   |   |  |  |                                       |
| 病期(stage); I IIa IIb IIIa IIIb IV<br>PS; ~ (まで)                    |   | <input type="checkbox"/> adjuvant <input type="checkbox"/> neoadjuvant <input type="checkbox"/> 再発・進行 <input type="checkbox"/><br>その他( ) |  |                                       |
| 薬剤の量・経路・時間・1クール of 投与方法・インターバル日数、最大投与回数(クール数)、化療ベット時間              |   |  |  |                                       |
| 薬品名  | 1回(1日)投与量                                       | 投与経路及び時間   | 投与方法(1クール)   |                                       |
| イリノテカン<br>(Irinotecan)   | 60mg/m <sup>2</sup>                             | div. (90分)   | day1, 8, 15  |                                       |
| シスプラチン<br>(Cisplatin)  | 60mg/m <sup>2</sup>                             | div. (2h)  | day1   |                                       |
| インターバル日数・<br>最大投与回数(End point)                                     | 4週毎   | 化療ベット予約: _____ 時間で登録   |  |                                       |
| Radiation 併用 無   | 1回 Gy×  | 日、Total  | Gy×  | Fr                                    |
| レジメン   |   |  |  |                                       |
| 投与時間   | 投与日及び投与ルート                                      |  |  |                                       |
| 内服   | アプレピタントカプセルを併用する。<br>day1は125mg<br>day2, 3は80mg |  |  |                                       |
|  | <b>day1</b>                                     |  | <b>day2, 3</b>                                     |                                       |
| 90分  | メイン①ソルデム3A                                      | 500mL 1B   | 90分  | メイン①ソルデム3A 500mL 1B                   |
| 30分  | メイン②生理食塩液                                       | 100mL 1B   | 30分  | メイン②生理食塩液 100mL 1B                    |
|  | デキサート注  | 6.6mg 1V   |  | デキサート注6.6mg 1V                        |
|  | デキサート注  | 1.65mg 2A  |  |                                       |
|  | アロキシ注   | 0.75mg 1V  |  |                                       |
| 90分  | 側①生理食塩液   | 500mL 1B   | 90分  | メイン③ポタコールR 500mL 1B                   |
|  | イリノテカン ( )mg                                    |  | 90分  | メイン④ポタコールR 500mL 1B                   |
| 90分  | 側②生理食塩液   | 500mL 1B   |  | メイン⑤ヘパリン Na ロック用(100単位/mL)<br>10mL 1本 |
| 30分  | メイン③マンニトールS                                     | 300mL 1B   |  |                                       |
| 2時間  | 側③生理食塩液   | 500mL 1B   |  | <b>day8, 15</b>                       |
|  | シスプラチン ( )mg                                    |  | 30分  | メイン①生理食塩液 100mL 1B                    |
| 90分  | 側④ソルデム3A  | 500mL 1B   |  | デキサート注 6.6mg 1V                       |
|  | メクロプラミド注  | 10mg 1A  |  | グラニセトロン注 1mg 1A                       |
|  | メイン⑧ヘパリン Na ロック用(100単位/mL)<br>10mL 1本           |  | 90分  | 側①生理食塩液 500mL 1B                      |
|  |   |  |  | イリノテカン ( )mg                          |
|  |   |  | 5分   | 側②生理食塩液 50mL 1B                       |
| 備考   |   |  |  |                                       |
| 【レジメンシステム登録】   |   |  |  |                                       |
| 74004-1B CPT-11+CDDP 療法<br>(膵・消化管神経内分泌)(アロキシ)<br>・アプレピタントは内服処方オーダー |   |  |  |                                       |