

81 胚細胞腫(肺)

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	科別(呼内)	81001-1B	TIP療法	

81001	胚細胞腫瘍 (肺)	TIP療法	申請科
			内科

H23.8 登録 H30.7 改定 R2.3 改訂 科別(呼内科)

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
パクリタキセル (Paclitaxel)	175mg/m ²	div. (3h)	day1
イホマイド (ifosfamide)	1000mg/m ²	div. (1h)	day1~5
シスプラチン (cisplatin)	20mg/m ²	div. (2h)	day1~5

3週毎

Regimen

day1		day2~5	
内服	アプレピタントカプセル(125mg)1Cap パクリタキセル投与30分前に レスタミン錠(10) 5錠 内服	内服	アプレピタントカプセル(80mg)1Cap
90分	メイン①ソルデム3A 500mL 1B	90分	メイン①ソルデム3A 500mL 1B
30分	メイン②生理食塩液 100mL 1B ファモチジン注 20mg 1V アロキシ注 0.75mg 1V デキサート注 6.6mg 1V	30分	メイン②生理食塩液 100mL 1B デキサート注 1.65mg 2V
30分	側①生理食塩液 100mL 1B	1時間	側①生理食塩液 100mL 1B イホマイド()mg
3時間	側②5%ブドウ糖液 500mL 1B パクリタキセル点滴静注液 ()mg	30分	側②生理食塩水 100mL 1B ウロミテキサン注100mg 4A
1時間	側③生理食塩液100mL 1B イホマイド()mg	2時間	側③生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg
30分	側④生理食塩水 100mL 1B ウロミテキサン注100mg 4A	3時間	側④生理食塩液 500mL 1B
2時間	側⑤生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg	30分	メイン③(側④と並行して投与) マンニトール S300mL 1B
3時間	側⑥生理食塩液 500mL 1B	30分	メイン④生理食塩水 100mL 1B ウロミテキサン注100mg 4A *イホマイド投与4時間後
30分	メイン③(側⑥と並行して投与) マンニトール S300mL 1B	3時間	メイン⑤ソルデム3A 500mL 1B
30分	メイン④生理食塩水 100mL 1B ウロミテキサン注100mg 4A *イホマイド投与4時間後	30分	メイン⑥生理食塩水 100mL 1B ウロミテキサン注100mg 4A *イホマイド投与8時間後
3時間	メイン⑤ソルデム3A 500mL 1B	備考 ・day1 側①生食はドリップアイを使用し滴下時間(30分)を調節するため側管から投与。 【レジメンシステム登録】 81001-1B TIP療法 ・アプレピタント、レスタミンはレジメン内の処方に登録	
30分	メイン⑥生理食塩水 100mL 1B ウロミテキサン注100mg 4A *イホマイド投与8時間後		