

13 副腎癌

※ レジメン名称を クリック または Ctrl+クリック してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、“現在のページを印刷する”を選んでください。

	分類	コード	レジメン名 称	備考
1	共通	13001-1A	EDP 療法	

13001	副腎癌	<u>EDP 療法</u>	申請科 泌尿器科
-------	-----	---------------	-------------

H22.10 登録 H27.7 改訂 H30.10 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂 **R7.6 改訂**

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1ケール)
ドキソルビシン塩酸塩 (doxorubisin)	20mg/m ²	div. (30min)	day1、8
シスプラチン(CDDP) (cisplatin)	40mg/m ²	div. (120min)	day1、9
エトポシド (etoposido)	100mg/m ²	div. (90min)	day5~7

4週毎 効果なくなるまで

Regimen

day1		day8	
6時間	メイン①ソルアセトF 500mL 1B	2時間	メイン①ソルアセトF 500mL 1B
30分	側①(メイン①と並行して投与) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V デキサート注 1.65mg 2A	30分	側①(メイン①と並行して投与) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート注 6.6mg 1V
30分	側②生理食塩液100mL 1B ドキソルビシン塩酸塩注()mg	5分	側②生理食塩液100mL 1B ドキソルビシン塩酸塩注()mg
30分	側③(メイン①を止めて投与) マンニットールS 300mL 1B	6時間	側③(メイン①を止めて投与) マンニットールS 300mL 1B
2時間	側④生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注()mg	30分	側④生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注()mg
5分	側⑤生理食塩液 50mL 1B		デキサート注 6.6mg 1V
6時間	メイン②ソルデム6 500mL 1B		デキサート注 1.65mg 2A
6時間	メイン③ソルアセトF 500mL 1B	30分	側②(メイン①を止めて投与) マンニットールS 300mL 1B
6時間	メイン④ソルデム6 500mL 1B	2時間	側③生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注()mg
day5~7			側④生理食塩液 50mL 1B
2時間	メイン①ソルアセトF 500mL 1B	5分	メイン②ソルデム6 500mL 1B
30分	側①(メイン①と並行して投与) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B	6時間	メイン③ソルアセトF 500mL 1B
90分	側②生理食塩液 500mL 1B エトポシド注()mg	6時間	メイン④ソルデム6 500mL 1B
5分	側③生理食塩液 50mL 1B		
備 考			
<推奨制吐剤>現行に追加 アプレビタント 125mg 1CP 分1 化学療法前 day1、9 アプレビタント 80mg 1CP 分1 朝食後 day2、3、10、11 テガドリコン錠 8mg 分2 day2~4、10~12			

オランザピン OD錠 5mg 1錠 分1 夕食後

day1~4、9~12

・アブレピタント、テカドロン錠、オランザピン OD錠は内服処方
オーダ

・オランザピン OD錠は糖尿病患者及び糖尿病の既往の
ある患者には禁忌

【レジメンシステム登録】

13001-1A EDP療法