

18 陰茎癌

※ レジメン名称を クリック または Ctrl+クリック してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、“現在のページを印刷する”を選んでください。

	分類	コード	レジメン名 称	備考
1	共通	18001-1A	MPB療法	
2	共通	18002-1A	MP療法	

18001

陰茎癌

MPB療法

申請科

泌尿器科

H22.6 登録 H.28.1 改訂 H30.7 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂 R5.12 改訂 R7.6 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
メソトレキセート (methotrexate)	100mg/m ²	div. (1h)	Day1、15
ブレオ (bleomycin)	10mg/m ²	div. (24h持続)	Day2~5
シスプラチニン (cisplatin)	20mg/m ²	div. (1h)	Day2~5
ダイアモックス錠 250mg (Acetazolamide)	2錠分2	MTX投与の 30分前、5時間後	Day1
ロイコボリン錠 5mg (leucovorin)	1日 25mg/6時間毎	メソトレキセート投与 24時間後より p. o.	Day2~4、16~18

4週毎 ブレオマイシンの総投与量300mgを超えない

Regimen

内服	day1、15 ダイアモックス錠 250mg 2錠分2 (MTX投与の30分前、5時間後)	6時間 24時間	day2~4 メイン①ソルアセトF 500mL 1B 側①(メイン①と並行して開始) 生理食塩液 50mL 1B ブレオ ()mg シリンジ 50mL に調製(シリンジポンプ使用) 側②(ブレオ投与開始後、並行して開始) 側①ブレオと別ルートで グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート6.6mg 1V
6時間	day2~4、16~18 メソトレキセート投与24時間後より ロイコボリン錠 5mg 20錠 分4 6時間	30分	側③(側②グラニセトロン、デキサート終了後、同一路から) マンニットール 300mL 1B メイン①、側①を止めて投与
15分	day1、15 メイン①ソルアセトF 500mL 1B メイロン7% 20mL 1A 側①(メイン①と並行して開始) 生理食塩液 50mL 1B デキサート 6.6mg 1V	30分	側④(側③マンニットール終了後、同一路から) 生理食塩液 100mL 1B シスプラチニン()mg
1時間	側②(側①終了後、続けて投与) 生理食塩液 100mL 1B メソトレキセート()mg	1時間	側⑤(側④シスプラチニン終了後、同一路から) 生理食塩液 50mL 1B
5分	側③(側②終了後、続けて投与) 生理食塩液 50mL 1B	5分	メイン②ヴィーン3G 500mL 1B
6時間	6時間	6時間	メイン③ソルアセトF 500mL 1B
6時間	6時間	6時間	メイン④ヴィーン3G 500mL 1B

Regimen

	day5		
6時間 24時間	メイン①ソルアセトF 500mL 1B 側①(メイン①と並行して開始) 生理食塩液 50mL 1B ブレオ ()mg シリンジ 50mL に調製(シリンジポンプ使用)		
30分	側②(ブレオ投与開始後、並行して開始) 側①ブレオと別ルートで) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート6.6mg 1V		
30分	側③ (側②グラニセトロン、デキサート終了後、同一路由から) マンニットール 300mL 1B メイン①、ブレオを止めて投与		
1時間	側④(側③マンニットール終了後、同一路由から) 生理食塩液 100mL 1B シスプラチナ()mg		
5分	側⑤(側④シスプラチナ終了後、同一路由から) 生理食塩液 50mL 1B		
6時間	メイン②ヴィーン3G 500mL 1B		
6時間	メイン③ソルアセトF 500mL 1B		
6時間 5分	メイン④ヴィーン3G 500mL 1B 側⑥(側①ブレオ終了後、同一路由から) 生理食塩液 50mL 1B		
		備 考	
		メソトレキセート投与72時間後にメソトレキセート 血中濃度測定し、 1×10^{-7} mol濃度以下であること確 認。これ以上の場合はロイコボリン内服を 1×10^{-7} mol濃度以下になるまで継続	
		<推奨制吐剤>現行に追加	
		アプレビタント 125mg 1CP 分1 化学療法前 day2	
		アプレビタント 80mg 1CP 分1 朝食後 day3~6	
		オランザピン OD 錠 5mg 1錠 分1 夕食後 day2~7	
		・アプレビタント、オランザピン OD 錠は内服処方オーダー	
		・オランザピン OD 錠は最大6日間の投与を目安	
		・オランザピン OD 錠は糖尿病患者及び糖尿病の既往の ある患者には禁忌	
		【レジメンシステム登録】	
		18001-1A MPB 療法	
		・ロイコボリン、ダイアモックスはレジメン内の処方に 登録	

18002

陰茎癌

MP療法

申請科

泌尿器科

H22.6 登録 H.28.1 改訂 H30.7 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂 R5.12 改訂 R7.6 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1ケール)
メソトレキセート (methotrexate)	100mg/m ²	div. (1h)	Day1、15
シスプラチン (cisplatin)	20mg/m ²	div. (1h)	Day2～5
ダイアモックス錠 250mg (Acetazolamide)	2錠分2	MTX投与の 30分前、5時間後	Day1
ロイコボリン錠 5mg (leucovorin)	1日 25mg/6時間毎	メソトレキセート投与 24時間後よりp. o.	Day2～4、16～18

4週毎 MPB有効時の維持療法

Regimen

内服	day1、15 ダイアモックス錠 250mg 2錠分2 (MTX投与の30分前、5時間後)	6時間 30分	day 2～5 メイン①ソルアセトF 500mL 1B 側①(メイン①と並行して開始) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 1B デキサート6.6mg 1V 側②(側①終了後、続けて投与) マンニットール 300mL 1B メイン①を止めて投与 側③(側②終了後、続けて投与) 生理食塩液 100mL 1B シスプラチン()mg
	day2～4、16～18 メソトレキセート投与24時間後より ロイコボリン錠 5mg 20錠 分4 6時間		
6時間	day1、15 メイン①ソルアセトF 500mL 1B メイロン7% 20mL 1A 側①(メイン①と並行して開始) 生理食塩液 50mL 1B デキサート 6.6mg 1V	1時間	生理食塩液 50mL 1B メイン②ヴィーン3G 500mL 1B
	側②(側①終了後、続けて投与) 生理食塩液 100mL 1B メソトレキセート()mg		メイン③ソルアセトF 500mL 1B メイン④ヴィーン3G 500mL 1B
15分	側③(側②終了後、続けて投与) 生理食塩液 50mL 1B	5分	備 考
	メイン②ヴィーン3G 500mL 1B メイロン7% 20mL 1A		メソトレキセート投与72時間後にメソトレキセート 血中濃度測定し、 1×10^{-7} mol濃度以下である こと確認。これ以上の場合はロイコボリン内服を 1×10^{-7} mol濃度以下になるまで継続
1時間	メイン③ソルアセトF 500mL 1B	6時間	<推奨制吐剤>現行に追加
	メイン④ヴィーン3G 500mL 1B		アプレビタント 125mg 1CP 分1 化学療法前 day2
5分		6時間	アプレビタント 80mg 1CP 分1 朝食後 day3～6
			オランザピンOD錠 5mg 1錠 分1 夕食後 day2～7
6時間			
6時間			

- ・アプレビタント、オランザピン OD錠は内服処方オーダー
- ・オランザピンOD錠は最大6日間の投与を目安
- ・オランザピン OD錠は糖尿病患者及び糖尿病の既往のある患者には禁忌

【レジメンシステム登録】

18002-1A MP 療法

- ・ロイコボリン、ダイアモックスはレジメン内の処方に登録